

FINOCCHIO

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	SOSTANZE ATTIVE E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONE D'USO
<p style="text-align: center;">CRITTOGAME</p> <p style="text-align: center;">Peronospora (<i>Phytophthora syringae</i>) (<i>Plasmopara nivea</i>)</p>	<p>INTERVENTI AGRONOMICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricorso ad ampie rotazioni; • impiego di seme sano; • uso razionale di concimazioni e irrigazioni. <p>INTERVENTI CHIMICI</p> <p>Intervenire alla comparsa dei primi sintomi</p>	Composti rameici	
<p style="text-align: center;">Cercosporiosi (<i>Cercospora foeniculi</i>)</p>	<p>INTERVENTI AGRONOMICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • impiego di seme sano <p>INTERVENTI CHIMICI</p> <p>Intervenire alla comparsa dei primi sintomi</p>	Composti rameici	
<p style="text-align: center;">Sclerotinia (<i>Sclerotinia spp</i>)</p>	<p>INTERVENTI AGRONOMICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare eccessi di azoto; • avvicendamenti con colture poco recettive, quali cereali; • bassa densità di impianto; • moderare le irrigazioni <p>INTERVENTI CHIMICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenire solo in caso di accertata presenza, prima della rincalzatura 	Dicloran	Al massimo 2 trattamenti per tale avversità

AVVERSITÀ	CRITERI DI INTERVENTO	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONE D'USO
BATTERIOSI (<i>Erwinia carotovora</i> v. <i>carotovora</i>)	INTERVENTI AGRONOMICI <ul style="list-style-type: none"> • impiegare seme sano; • evitare eccessi di azoto; • non irrigare per aspersione; • bassa densità di impianto; • evitare ferite durante i periodi particolarmente umidi; • Asportare ed eliminare i residui della coltura dopo la raccolta. 	Composti rameici	
FITOFAGI Afidi (<i>Dysaphis</i> spp)	Intervenire alla comparsa delle prime infezioni	Lambda-cialotrina Piretrine naturali	Al massimo 1 intervento per tale avversità
Nottue (<i>Agrotis</i> spp) (<i>Mamestra brassicae</i>)	Utilizzare trappole a feromoni per verificare la loro presenza Intervenire solo in caso di attacchi consistenti	<i>Bacillus thuringiensis</i> Metiocarb(1)	(1) Impiegato come esche pronte all'uso
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp.)	INTERVENTI CHIMICI Intervenire in modo localizzato al trapianto o semina ove è stata accertata la presenza o nei terreni in cui, da osservazioni precedenti, si è certi della presenza.	Teflutrin	Da impiegare solo al terreno al momento del trapianto o semina